

DESÓRDENES ORALES POTENCIALMENTE MALIGNOS: REVISIÓN Y ANÁLISIS DE BIOPSIAS REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 1954-2023 EN LA CÁTEDRA DE ANATOMÍA Y FISIOLÓGIA PATOLÓGICAS DE LA FOR-UNR

IGLESIAS, Belén; MERLETTI, Gustavo; TRAVERSO, Paula; SABELLA, Silvina; PIANOSKY, Paulina; ALESSIO Verónica; MACHUCA VEGA, Analía; BARROS, Sabrina; GUENZELOVICH, Mariel.

Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológicas. Facultad de Odontología-UNR, Argentina.

E-mail: marielguenzelovich@gmail.com

Palabras Claves: Desórdenes orales potencialmente malignos, displasias epiteliales, cáncer oral.

INTRODUCCIÓN

Los desórdenes orales potencialmente malignos (DOPM) son lesiones de la mucosa oral con riesgo de transformación maligna (OMS 2020), entre ellas leucoplasia (L), liquen plano oral (LPO) y queilitis actínica (QA). La presencia de displasia epitelial es un hallazgo histopatológico clave por su potencial de malignización si no se controla adecuadamente.

OBJETIVOS

Determinar la prevalencia y frecuencia de los DOPM (1954-2023), relacionarlos con edad, sexo y localización anatómica, y registrar los casos con displasia epitelial.

METODOLOGÍA

Estudio retrospectivo, transversal, descriptivo, observacional. Archivo de la Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológicas de la UNR y su Servicio. N:11507 (1954-2023) DOPM según OMS 2020: 728 biopsias Variables: edad, sexo localización anatómica y displasia. Estimación de Odds Ratio (OR) (IC.95%); prueba chi-cuadrado ($p < 0,05$).

RESULTADOS




Figura 1: Comparación de la incidencia de displasias en tres lesiones orales




Figura 2: Localización anatómica de los tejidos displásicos hallados en tres lesiones orales

Se analizaron 728 biopsias: 353 mujeres y 375 hombres, edad promedio 54.4 ± 3.7 años ($\pm$ ESM). Los tres DOPM fueron grupos comparables en edad y sexo. Las leucoplasias predominaron en la mucosa yugal y en la lengua (163 y 57 casos, respectivamente), al igual que LPO (207 y 46 casos, respectivamente). Las QA en labio inferior. La tasa de DOPM con displasias epiteliales fue del 14,8% (108/728), con significativas diferencias entre los tres trastornos evaluados; $P=0.0002$. El hallazgo de displasias epiteliales en las QA (23.2%) fue 2.6 veces más frecuente que en las leucoplasias (17.1%) y que en LPO (10.3%): $OR=2.6$ (1.3 – 5.1) y en las leucoplasias fueron significativamente más frecuentes que en LPO; $OR=1.8$ (1.1 – 2.8).

CONCLUSIONES

Los DOPM representan un hallazgo frecuente en nuestro estudio, siendo la leucoplasia la de mayor frecuencia, seguida por LPO y QA. Sin embargo, esta última mostró la mayor proporción de displasias epiteliales. Estos datos refuerzan la importancia del diagnóstico histopatológico temprano y del seguimiento sistemático de las lesiones, particularmente de la queilitis actínica, dada su elevada asociación con alteraciones displásicas. La caracterización epidemiológica de estos desórdenes según edad, sexo y localización anatómica contribuye a optimizar las estrategias de prevención y detección precoz del cáncer oral.

