XX Jornadas de Ciencias, Tecnologías e Innovación UNR

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS POR LA COHORTE 2024 DE LA CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA. 2da. PARTE: MAXILAR SUPERIOR

BLOTTA, Francisco[1]; GIANGIACOMO, Leonel; RIZZO, Gabriel, RODRIGUEZ, Luciana; SPOLETI, Pablo.

[1]Cátedra de Endodoncia/ endo.unr@gmail.com

Palabras claves: EPIDEMIOLÓGICO; PACIENTES; ENDODONCIA.

INTRODUCCIÓN

El análisis epidemiológico de los pacientes atendidos en la Carrera de Postgrado de Especialización en Endodoncia de la Universidad Nacional de Rosario (CPEE-UNR) resulta clave para el desarrollo institucional de la carrera.

OBJETIVOS/HIPÓTESIS

- Caracterizar la población atendida por la cohorte 2024 de la CPEE-UNR a través de un estudio epidemiológico descriptivo;
- Conocer la patología pulpar y periapical prevalente.

METODOLOGÍA / MATERIALES Y MÉTODOS

Como herramienta de recolección de datos, se utilizaron formularios estructurados en la plataforma Google *Forms*, los cuales fueron completados por los alumnos de la carrera. Los registros fueron consolidados en una hoja de cálculo de Google *Spreadsheets*, empleada como la base de datos principal del estudio. Los participantes involucrados en los procesos de diagnóstico, registro y carga de los datos fueron calibrados antes de comenzar con la carga.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Se registraron 409 pacientes con una edad promedio de 35 años (rango: 9-84 años) con un predominio del sexo femenino (66,3%). El 59,2% de los tratamientos se realizó en el maxilar superior; registrándose la mayor prevalencia en el primer molar derecho (14%). Las patologías prevalentes fueron pulpitis irreversible sintomática a nivel pulpar (33,5%) y tejido periapical normal a nivel periapical (66,5%), el 40% de los pacientes acudió a la consulta refiriendo algún tipo de dolor.




Figura 1. Distribución etárea de la población asistida CPEE-UNR




Figura 2. Distribución de piezas dentarias afectadas

CONCLUSIONES

El marcado predominio del sexo femenino (66,3%) coincide con lo reportado en estudios previos realizados en la población atendida por alumnos de grado. Por otra parte, el 69% de la muestra se concentra entre los 18 y 51 años (edad promedio: 35 años; desviación estándar: 16,41). Este perfil demográfico denota una mayor afluencia de pacientes adultos, aportando indicadores de valor para la programación de las actividades clínicas. La prevalencia del primer molar superior derecho (25,6%) en el total de tratamientos registrados puede explicarse por la cronología de la erupción dentaria. Asimismo, que la pulpitis irreversible sintomática sea la patología pulpar prevalente (33,5%) destaca que el dolor constituye el principal motivo de consulta en nuestra población. Dicha situación evidencia una contradicción: mientras que el tratamiento endodóntico es una práctica programada y de segundo nivel (complejidad mediana/alta), en la realidad la CPEE-UNR absorbe una demanda de urgencias odontológicas que deberían ser resueltas en otras instancias institucionales. Este desajuste dilata los tiempos de espera para tratamientos planificados, evidenciando la necesidad de revisar los criterios de derivación y fortalecer la articulación intra-institucional. Finalmente, el hallazgo de que el 66,5% de los diagnósticos periapicales corresponde a tejido periapical normal sugiere que los pacientes acuden a la consulta antes de que la patología inflamatoria evolucione lo cual plantea un escenario favorable para el pronóstico a largo plazo. La caracterización demográfica provista por este trabajo aporta información esencial para planificar de manera eficiente tanto la atención de los pacientes como las actividades académico-administrativas de la carrera.