XX Jornadas de Ciencias, Tecnologías e Innovación
FOR/UNR SECRETARÍA DE CyT
UNR

CONOCIMIENTOS SOBRE ITS, SALUD BUCAL Y PRÁCTICAS DE CUIDADO EN ADOLESCENTES.

Chia M.P.; Mateu Gagliardi, J.; Copello, M.N.;.Gaiteri, M.; Salum F.; Steffanini, C.; Salas, A.L.
Docentes del Área de Odontología Social, preventiva y Sanitaria. FACULTAD ODONTOLOGIA ROSARIO. UNR.
maximilianochia@outlook.com

INTRODUCCIÓN

El incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en la población adolescente representa un desafío creciente para la salud pública. La mayor frecuencia de manifestaciones orales asociadas a estas infecciones resalta la necesidad de fortalecer las estrategias de promoción de la salud, prevención y detección precoz. En este contexto, el estudio de las construcciones sociales de los adolescentes aporta información relevante para el diseño de intervenciones de salud bucodental en el ámbito escolar, adaptadas a las características y necesidades de esta población.

OBJETIVO

Identificar los conocimientos y las prácticas de cuidado de adolescentes en relación con ITS y salud bucal, para orientar estrategias de cuidado.

METODOLOGÍA

Estudio observacional, descriptivo y transversal.
Muestra de 319 adolescentes de 13 a 17 años de dos escuelas técnicas de la ciudad de Rosario.
Recolección de información: cuestionarios en línea, anónimos, semiestructurados y voluntarios,
Procesamiento de datos: mediante estadística descriptiva y prueba de chi-cuadrado, con un nivel de significación de $p < 0,05$.

RESULTADOS

IDENTIFICACIÓN POR GENERO:
85,6% MASCULINO- 12,8% FEMENINO -1,6%NO BINARIO

COBERTURA SANITARIA: 44,5% Sistema Público-37,9% Obra Social - 17,6% Medicina Prepaga.




GRÁFICO N°1: ¿Sabías que son la ITS?

Valor de p= 0.0072 Aumentan los conocimientos con la edad




GRÁFICO N°2: Asoc. estadísticamente significativa entre conocer qué son las ITS y reconocer su transmisión por sexo oral ($p < 0,001$):




GRÁFICO N°3: Se halló una asociación estadísticamente significativa entre EDAD y USO DE PRESERVATIVO ($\chi^2 = 31,56$; $p < 0,001$)

VIA DE TRANSMISIÓN ORAL:
41,4% la conocen.
24,8% la desconocen.

Del total sólo el 49,5% (158) reconoció que las ITS pueden producir lesiones en la cavidad bucal.

A los 15-16 años más del 70% de los adolescentes aún no había iniciado relaciones sexuales.
A los 17 años esa proporción cayó a 28,2% y este último grupo concentró la mayor proporción de **uso ocasional o ausente del preservativo** (43,6%), **lo que lo convierte a este grupo etario en el de mayor riesgo.**

PRINCIPAL FUENTE DE INFORMACIÓN: LA ESCULEA

68,7% (219) EXPRESÓ INTERÉS EN RECIBIR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA POR LO QUE ACTUALMENTE SE ESTAN REALIZANDO TALLERES CON LOS ALUMNOS INTERESADOS EN SUS RESPECTIVAS ESCUELAS.

CONCLUSIONES

Los resultados evidencian que, si bien la mayoría de los adolescentes reconoce qué son las ITS, persiste un desconocimiento significativo respecto de sus manifestaciones orales, y las conductas de riesgo se intensifican en la etapa de mayor actividad sexual (17 años). El interés por ampliar la información y la escasa identificación de fuentes confiables sustentan los talleres que actualmente se desarrollan, articulando salud sexual y bucal a partir de las necesidades identificadas.